

CYTOPONCTION THYROÏDIENNE

Dr Muriel BOURGEON, Jocelyne MEMBA

Madame, Monsieur,

Vous allez avoir une ponction de la thyroïde. Il s'agit d'un geste utile, simple et bien toléré, sous réserve de quelques précautions à observer :

- Ne pas prendre d'Aspirine dans les 8 jours précédant la ponction ;
- Nous signaler si vous prenez des anti-agrégés ou des anti-coagulants pour adaptation du traitement ;
- Maintenir un pansement pendant les 12 heures qui suivent la ponction pour éviter l'apparition d'un hématome.

En cas de gêne ou de douleurs locales survenant dans les suites de la ponction et se prolongeant au delà des 24 heures, vous pourrez joindre un médecin au 01 69 49 74 00.

Le résultat de la ponction nécessite une analyse spécialisée. Il sera communiqué par courrier au médecin ayant prescrit la ponction dans un délai de 2 à 3 semaines. Un courrier du médecin prescripteur vous parviendra dès réception du résultat.

Dans 5 à 10% des cas environ, les cellules recueillies sont en nombre insuffisant pour permettre un diagnostic fiable ce qui peut éventuellement conduire à renouveler la ponction.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les informations et explications complémentaires que vous pourriez souhaiter.

N'hésitez pas à poser toutes les questions à votre médecin, qui y répondra de façon spécifique, en tenant compte de votre cas particulier.